

## Titulo: El viaje

Integrantes: Vicente Castillo Rodríguez, Ramiro Soberanis Ayerdi, Antonio Silva Serna  
ESCUELA.- CUAM ACAPULCO  
AREA HUMANIDADES

Objetivo: conocer y dar a conocer las causas i consecuencias más a profundidad q causan las drogas desde una perspectiva juvenil

Antecedentes: Los descubrimientos de nuevos fármacos y drogas han ayudado a enfermedades y aliviar el dolor. Por sus efectos alucinógenos y psicoactivos algunas personas las usan para evadir la realidad. Los jóvenes las utilizan en forma de rebelión o para sentir placer momentáneo que se convierte poco a poco en una dependencia física y psicológica con graves consecuencias de salud. La cocaína, heroína, marihuana, opio, fueron utilizados para la fabricación de píldoras, ungüentos y jarabes que eran promovidos para aliviar varias enfermedades y que habrán pasado por un proceso de estudio exhaustiva en laboratorios especializados. Al poco tiempo fueron sacados del mercado cuando se descubrieron sus efectos nocivos para la salud, ya que causaban una dependencia con graves enfermedades físicas y psicológicas

### Marco teórico:

#### POPPER

El popper es otro estimulante y vasodilatador. No se trata de un producto muy nuevo, pues hasta hace poco podía adquirirse en algunos sex-shops en los que se vendía como afrodisíaco. Se trata de nitrito de amilo, y se consume en forma de líquido incoloro e inodoro mediante inhalación. Los traficantes lo comercializan en pequeños frasquitos, a veces en tubos de ensayo de laboratorio, por un precio que oscila entre los 30 y los 36 euros.

Los efectos son muy rápidos. a los pocos segundos de la inhalación, casi instantaneamente, se produce una fuerte sensación de euforia y se acentúa la sociabilidad. Los efectos tardan poco en desaparecer y entonces se produce el "bajón", agotamiento y una considrable depresión. El nitrito de amilo es uno de los nitritos más característicos, y produce una relajación de las células musculares (lisas) del organismo. Como vasodilatador produce un característico enrojecimiento de la cara y el cuello en sus consumidores. Su acción sobre el Sistema Circulatorio repercute en el corazón. Puede provocar:

- Taquicardia
- Mareos
- Hipotensión
- Cefaleas
- Vómitos

Crea tolerancia y una considerable dependencia física, lo cual unido a la breve duración de sus efectos buscados , lo convierte en una droga peligrosa. En España también se han producido fallecimientos por su consumo.

#### EXTASIS (MDMA)

El éxtasis es un derivado de las anfetaminas conocido como 3-4 Metilendioximetanfetamina (MDMA). Sus efectos son, por tanto, similares a los del resto de los derivados de la anfetamina-mescalina.

#### Presentación

Normalmente se presenta en pastillas que no superan el tamaño de una aspirina, aunque puede distribuirse también en polvo. La mayoría de las pastillas son de color rosáceo, y fundamentalmente blancas, amarillas o azulonas.

Efectos buscados:

- Reducción de la sensación de hambre y sed.
- Reducción del cansancio y del sueño
- Aumento de la autoestima y sensibilidad emocional
- Afectividad
- Locuacidad
- Desinhibición
- Aumento de la empatía

Según la tolerancia que se haya desarrollado el efecto de la dosis puede durar hasta cuatro horas, comenzando a disminuir ya una hora después de la ingesta. La dosis de varía extremadamente de unas pastillas a otras, incluso entre las procedentes de una misma remesa, de tal forma que puede llegar a consumirse un éxtasis con 0 mg de MDMA o hasta con 260 mg, con lo cual los efectos pueden desde no aparecer hasta provocar la muerte. Sólo con un análisis químico previo es posible determinar la cantidad que hay en la pastilla.

#### TOLERANCIA Y DEPENDENCIA

La capacidad del éxtasis para crear tolerancia y dependencia es sin duda una de las cuestiones más polémicas, ya que aun no se han realizado los estudios necesarios como para que ésto quede totalmente admitido. No obstante todo indica que esta droga psicoestimulante provoca tolerancia, dependencia física y psíquica y hasta síndrome de abstinencia:

#### EFFECTOS NEGATIVOS

- Taquicardia, insomnio, pérdida del apetito
- Sudoración anormal, sequedad en la boca.
- Tensión mandibular
- Movimientos compulsivos de la lengua
- Sofocación, temblor, nauseas.
- Merma de la capacidad de concentración
- Cambios en la percepción de los colores (sin llegar a crear alucinaciones)

#### COCAÍNA

Se ha convertido en una de las drogas más consumidas, traídas y llevadas por todo el mundo. Convertida en producto nacional en algunas zonas del centro y sur de América, exportada y reciclada en crack y otras variantes en Estados Unidos, Canadá y México, está causando también grandes problemas en numerosos países de Europa y comenzando a extenderse por el Este y la naciones del antiguo bloque soviético.

Efectos buscados

La acción y los efectos son bastante rápidos. A los cinco minutos de haberse esnifado comienza un estado de euforia y el individuo se "acelera". El sentimiento más predominante es el de grandiosidad. A los 10-20 minutos se llega al punto máximo y al cabo de una hora el efecto ha desaparecido casi por completo. Actúa como un estimulante de efectos similares a los producidos por el éxtasis, pero no desarrolla el componente de sociabilidad y comunión con el resto.

### Tolerancia y dependencia

La capacidad para crear dependencia física aun es un tema de discusión y debate. Por otro lado, su capacidad para crear tanto tolerancia como adicción psíquica son, sin embargo, hechos aceptados.

Los efectos conscientes de la cocaína duran poco, y sus consumidores desarrollan pronto una tolerancia que les lleva a duplicar y triplicar la cantidad administrada en una hora. Es decir, si al principio con el efecto de una "rayita" se mantenían eufóricos durante una hora, con la costumbre se llega a necesitar tres. El síndrome de abstinencia que provoca puede durar meses y consiste en depresión, insomnio, irritabilidad, ansiedad, anorexia... y requiere psicoterapia.

Los adictos a la cocaína tardan tiempo en tomar conciencia de su condición y pedir ayuda. En los últimos años se ha producido un aumento del 1000% en el número de personas que acuden a centros de atención al toxicómano para desengancharse de la cocaína.

### Efectos negativos y residuales

- Taquicardia, aumento de la presión arterial.
- Hipertermia, inquietud, agitación psicomotora.
- Ansiedad y pérdida del apetito

En nuestro país, a finales de los '80 se empezaron a registrar los primeros ataques epilépticos a causa del consumo de esta droga, así como las primeras hospitalizaciones en los servicios de urgencias.

## CRACK

Sin duda se trata de la variante más peligrosa de la cocaína. El compuesto es clorhidrato de cocaína "cocinado" con productos de droguería. Es muy potente y sus efectos son mucho más destructivos. Además es de acción rápida: El crack suele consumirse fumado y hace efecto en menos de 10 segundos. Su capacidad de adicción es tan alta que entre los habituales se dice que "con la primera calada ya puedes quedar enganchado".

## LSD: "TRIPPIS" O "AJOS"

Se trata del famoso ácido lisérgico (dietilamina del ácido lisérgico) que ya se pusiera de moda entre los hippies de los años '60.

### Efectos buscados

- Alteraciones visuales y auditivas.
- Despersonalización (integración con "el todo"), pseudoalucinaciones
- Atemporalidad, trascendencia, introspección.

### Tolerancia y dependencia

La tolerancia hacia el LSD se desarrolla con bastante rapidez, y su dependencia se produce tras un uso reiterado.

### Efectos negativos

- Taquicardia, hipertermia, náuseas.
- Vértigo, temblores, pérdida de la memoria
- Cambios de humor y depresión.

## CANNABIS: EL HACHIS Y LA MARIHUANA

Realmente el cannabis no es una droga de diseño o de síntesis, pero la popularidad de la que goza entre algunos sectores y la preocupación que despierta entre los padres/madres y educadores, nos lleva a incluirla en esta página.

### EFFECTOS BUSCADOS

- Euforia, sensación de bienestar
- Atemporalidad
- Agudizamiento de los sentidos visual y auditivo

### TOLERANCIA Y DEPENDENCIA

Está demostrado que el consumo de marihuana provoca el desarrollo de tolerancia hacia muchos de sus efectos, es decir, que el consumidor necesita ir subiendo la dosis para notar los mismos efectos. Existe, así mismo, una dependencia psíquica de la sustancia. La dependencia física es sin embargo muy baja, aunque en ocasiones puede producirse un síndrome de abstinencia caracterizado por temblores, náuseas, diarrea, anorexia, insomnio e irritabilidad.

### EFFECTOS NEGATIVOS

- Taquicardia, hipotensión.
- Disminución de la coordinación espacial y motora (equilibrio, capacidad para calcular las distancias, reflejos, fuerza...)
- Alteraciones en el funcionamiento de los ovarios y los testículos (alteraciones en el ciclo menstrual y reducción en el número y movilidad de los espermatozoides)
- Problemas para el aprendizaje y la retención (memoria) de la información.

**Metodología:** Investigación documental y de campo por medio de encuestas.

**Resultado:** nos dimos cuenta que la verdad el mundo de las drogas cada vez penetra mas en la juventud de nuestro país por diversos motivos de debilidad que tenemos nosotros los jóvenes se vio que ahora en el 2009 solo en nuestro estado de Guerrero se vieron drogadictos desde primaria

**Conclusión:** las verdad hace falta mas conciencia y que los jóvenes tomen en cuenta los consejos y moralejas que tanto medios de comunicación, como escuelas y sus padres les quieren inculcar para que no arruines su vida ya sea vendiendo o consumiendo las drogas, no se les enseña a tenerles miedo si no a respetarlas drogas

Bibliografía: <http://www.stop-drogas.com/content/ghb.html>

Periódico novedades de Acapulco en varios de sus ejemplares  
Encuestas en el CUAM Acapulco